

# Sall

## Sall (high conc.)

### I. 認識配列

5'.....G▼ TCGA C.....3'  
3'.....C AGCT▲ G.....5'

### II. 保存

-20°C

### III. 活性定義

1 unit は、反応混合液 50  $\mu$ l 中、1  $\mu$ g の  $\lambda$ DNA を 37°C、60 分間で完全に分解する酵素活性とする。

### IV. 起源

*Streptomyces albus* G

### V. 形状

50 mM KCl  
5 mM リン酸カリウム (pH 7.4)  
0.1 mM EDTA  
1 mM DTT  
0.5 mg/ml BSA  
50% Glycerol

### VI. 酵素反応条件

・反応温度 : 37°C  
・バッファー : H

100 mM NaCl
50 mM Tris-HCl (pH 7.9)
10 mM MgCl <sub>2</sub>
1 mM DTT

### VII. 添付品

・10 x H Buffer (赤色ラベル)  
添付反応バッファーは、酵素反応条件の 10 倍濃度です。  
制限酵素のチューブのラベルと同色のラベルのものをご使用ください。

### VIII. 反応バッファー別相対活性

Buffer	L	M	H	A	B
相対活性 (%)	<5	<5	100	<5	5

### IX. 純度

本酵素 20 units と 1  $\mu$ g の  $\lambda$ DNA を 37°C で 5 時間反応させた後、アガロースゲル電気泳動を行った結果、切断パターンに変化は認められない。

### X. 結合試験

本酵素で完全に切断された  $\lambda$ DNA フラグメントの 80% が T4 DNA リガーゼで結合され、そのうち 100% が本酵素で再切断される。

### XI. 備考

- ・本酵素は、高グリセロール濃度、DMSO 存在下でスター活性を示すことがある。
- ・制限酵素のスター活性やメチル化の影響など、さらに詳しい情報についてはニッポンジーンのホームページをご参照ください。

本品は、試薬(試験研究用)として販売しているものです。  
医薬品の用途には使用しないでください。